

Verslaglegging

NATURA 2000-GBIED: OLDE MATEN & VEERSLOOTSLANDEN VERSLAG VELDBEZOEK DD. 23 MEI 2018

Aanwezig namens Provincie:

Aanwezig namens

Aanwezig namens

Aanwezig namens

Datum bezoek:

23 mei 2018

Doel

Op 23 mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Olde Maten & Veerslootslanden. Dit in het kader van het jaarlijkse veldbezoek zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Programma Aanpak Stikstof. Doel van het bezoek was na te gaan of de in de gebiedsanalyse voor het gebied voorziene ontwikkeling van de diverse stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op koers ligt. Wij hebben op locaties gekeken of er bijzonderheden of afwijkingen in het veld te zien waren (veldimpressie) ten opzichte van de verwachtingen uit de gebiedsanalyse. We hebben locaties bezocht die zijn aangewezen als habitatype, maar hebben ook locaties gezocht die van belang zijn voor natuurontwikkeling. We hebben op de volgende locaties gekeken.:

1. Trilveen-, veenmosrietland- en krabbenscheervegetaties achter de veldschuur
2. Stuw Kostverlorenstreng, overlaat voor Oldematengebied bij hoog water
3. Enkele percelen met Habitatype H7140B Veenmosrietland waar net gemaaid is
4. Ecoaquaduct
5. Het blauwgrasland en veenmosrietland ten noorden van de Conradsweg
6. Percelen met ingericht blauwgrasland
7. Reservaatsgebied Veerslootslanden
8. Stuw Rechterense weg

Een deel van deze locaties(1, 5, 7) komen overeen met de locaties die in 2016 en 2017 zijn bezocht met als doel een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de habitattypen op deze locaties door de jaren heen d.m.v. herbezoeken.

Bijlage: kaarten met de locaties die zijn bezocht

Bevindingen

Onze bevindingen zijn:

1. Trilveen-, veenmosrietsland en krabbenscheervegetaties achter de veldschuur
Locatie waar we geweest zijn is niet aangeduid als habitatype. We zien wel krabbenscheervegetaties, grote boterbloem, waterviolier. In de zomer zakt hier waterpeil weg. We zien op plekken aanzet tot verlanding trilveenvorming, wel in kleine oppervlakte. Verschillende soorten zeggen komt er voor. We zien draadzegge, geelgroene zegge en blonde zegge. We zien ook tormentil. In een smalle strook langs de boksloot zien we aanzet tot blauwgrasland met blonde zeggen. Het gaat om een afstand van ca 80 x 1 m en kwalificeert daarom niet als

habitattype. Het maaibeheer van de veenmosrietland- en trilveenvegetaties dient beter gewaarborgd te worden met specifieke aandacht voor deze vegetatietypen. Dit kan door opname onder dit beheertype in SNL. De ontwikkeling van deze gebieden voldoet verder aan onze verwachtingen.

2. Stuw Kostverlorenstreng, overlaat voor Olde Matengebied bij hoog water
We merken op dat de waterstanden erg laag zijn (-1.15). Peil zakt lager uit dan ondergrens. Het borgen van hoge waterstanden is belangrijk aandachtspunt voor natuurkwaliteit.
3. Perceel 1 (op de kaart punt 3) met Habitattype H7140B Veenmosrietland is net gemaaid. We zien verschillende soorten zeggen, kamvaren, kleine zonnedaauw. Het beheer van dit habitattype is aandachtspunt. Vorig jaar erg verruigd. Nu is het gemaaid, maar nog steeds verruigd.
Perceel 2 (op de kaart punt 4) Er is een start gemaakt met beheer, maar perceel is nog steeds verruigd. Er liggen kansen voor uitbreiden habitattypen. Beheer is een aandachtspunt.
Perceel 3 (op de kaart punt 6). We zien veel krabbenscheer vegetaties. Opvallend is dat waterstand te laag is. Mogelijk kunnen krabbenscheer vegetaties zich ontwikkelen door reeds aanwezige voedingsstoffen in de grond.
4. Ecoaquaduct
We zien ook hier lage waterstand. Onduidelijk is of dit eco aquaduct alleen als ecoduct bedoeld is of ook bedoeld is voor wateraanvoer.
5. Percelen bij Conradsweg:
De percelen die op de kaart zijn aangegeven als veenmosrietland (H7140B) zijn verlande petgaten. Er komen soorten voor als kamvaren, ronde zonnedaauw, draadzegge, biezenknoppen en tormentil. Het beheer, in de zomer maaien, is al jarenlang bestendig. Vorig jaar zagen we bij het bezoek boompjes staan die al meerdere jaren niet bij het maaien zijn meegenomen, waardoor ze te groot zijn om nog te maaien. Aandachtspunt voor het beheer was daarom dat ook bosopslag bij het maaien goed verwijderd wordt. Dit jaar zien we dat het wel gemaaid is. Dit is echter nog niet helemaal correct gedaan. Het habitattype handhaaft zich hier verder goed.
Het perceel blauwgrasland op de HT kaart is evenals bij het vorige veldbezoek (2016 en 2017) nader bekeken: er lijkt hier sprake van een misinterpretatie van de karteergegevens, dit zal bij de volgende SNL kartering worden rechtgezet. Er is geen sprake van H6410. Wij constateren geen afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen.
6. Ingericht blauwgrasland: Dit is geen habitattype. Kan wel ooit habitattype blauwgrasland worden. Ook hier zien we laag waterpeil. Kansen voor habitatontwikkeling. We zien Spaanse ruiter, zonnedaauw en verschillende zeggen. Mogelijk is er te weinig kwel voor vegetaties die afhankelijk zijn van een meer gebufferde omstandigheden.
Reservaatgebied: Stabiel. In Veerslootslanden wordt op kleine schaal gevarieerd beheer (bv delen later maaien of niet tbv vlinders) toegepast. De stuw bij Veerslootslanden is in werking. In de winter wordt het gebied korte perioden geïndeerd. Verder is er sprake van maaibeheer. Een aantal typerende soorten zijn nog niet in aantal toegenomen.
7. We hebben stuw bij Rechterenseweg bezocht. Mogelijk inlaatpunt. Ook hier zien we laag waterpeil.
8. De bemesting van N12.02 in Olde Maten komt ter sprake. Vanuit stikstofinpunt en gevoeligheid van N voor diverse habitattypen strookt bemesting van N12.02 niet met de PAS doelstellingen. Afspraak is dat SBB kaart maakt met N12.02 percelen waar leden van de ANV mest uitrijden. De deelnemers van het PAS veldbezoek zijn het er over eens dat bemesting van N12.20 binnen Olde Maten afgebouwd dient te worden.

9. Bij afgegraven percelen proefgebied wordt uitleg maaisel vanuit reservaat getoond. Het heeft geleid tot vestiging van Borstelgras; een soort die veel moeite heeft zich spontaan in nieuwe natuur te vestigen. Er wordt afgesproken dat SBB deze zomer maaisel van het reservaat dun uitstrooit in de afgegraven percelen om ontwikkeling richting blauwgrasland te versnellen.

Conclusie

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in het Natura 2000-gebied ligt op koers. Het hydrologisch systeem blijft een aandachtspunt voor het bereiken van de natuurdoelen omdat deze nog niet op orde is en plaatselijk laat het beheer en actieve bemesting te wensen over.

Dit verslag is vastgesteld door:


Provincie:



Bijlage: Kaarten en foto's bezochte gebieden



Percelen ten noorden van Conradsweg:




Percelen nabij de veldschuur:



Ecoaquaduct



Reservaatsgebied en proefgebied:



Waterpeil Oldematen




H7140B percelen (oranje) binnen boksloten langs de Zwartewaterkloosterweg:



Krabbenscheer vegetaties



LG05 (het geelgroene vlak), splitsing Conradsweg en Zwartekloosterweg:



Percelen met potentieel toekomstig kwalificerend habitattype (verlandingsvegetatie en krabbenscheervegetatie) ten westen van de Rechterensweg:



Veenpluis

