

Verslaglegging

NATURA 2000-GEBIED: BOETELERVELD VERSLAG VELDBEZOEK DD. 6 JULI 2016

Aanwezig namens Provincie:
Aanwezig namens Landschap Overijssel:
Overige aanwezigen:
Datum bezoek:

[Redacted] J
[Redacted] J & [Redacted] J
[Redacted] J (OPG)
6 juli 2016

Doel

Op 6 juli 2016 hebben wij een bezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Boetelerveld. Dit in het kader van het jaarlijkse veldbezoek zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Programma Aanpak Stikstof. Doel van het bezoek was na te gaan of de in de gebiedsanalyse voor het gebied voorziene ontwikkeling van de diverse stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op koers ligt. Wij hebben op de volgende locaties gekeken of er bijzonderheden of afwijkingen in het veld te zien waren (veldimpressie) ten opzichte van de verwachtingen uit de gebiedsanalyse. Specifieke aandacht hebben we gehad voor:

- Het kleine turfgat (blauwgrasland & heischraal grasland)
- Het grote rietgat (zwakgebufferd ven met drijvende waterweegbree)
- Lage delen met vochtige heide en pioniervegetaties met snavelbiezen
- Jeneverbesstruweel
- Poelen voor de kamsalamander

Bijlage: kaart met de locaties die zijn bezocht

Bevindingen

Het Boetelerveld is een nat gebied waarbij kleine hoogteverschillen en ondoorlatende bodemlagen in samenspel zorgen voor een gevarieerd gebied met veel overgangen tussen vegetaties. De ene plek is nat en zuur, de volgende krijgt wat minder zuur water maar is wel nat en weer een ander ligt iets hoger en droger. De variatie en de overgangen tussen de types maken het Boetelerveld bijzonder, net als de totale omvang van de vochtige heide.

Onze bevindingen zijn:

- Rondom het kleine turfgat liggen heischrale graslandvegetaties (H6230) en blauwgrasland (H6410). Ook komt er vochtige heide voor. We hebben o.a. gevlekte orchis, moeraswespenorchis, wilde bertram, grote wederik en vlozegge aangetroffen. De soorten van voedselrijkere, zuurdere en drogere omstandigheden lijken het beter te doen dan de soorten van voedselarme, basenrijke omstandigheden. Wij hebben geen onverwachte zaken aangetroffen. De vegetaties die geplagd zijn en nu in maaibeheer lijken zich in de goede richting te ontwikkelen, hoewel dit een tijdelijk effect van bekalking kan zijn. Voor behoud van de vegetaties is het belangrijk dat de maatregelen worden uitgevoerd op korte termijn.
- Het grote rietgat is een besloten ven (H3130) op dit moment, waardoor de relatie tussen het ven, de vochtige heide (H4010A) en de andere vegetaties in het Boetelerveld niet optimaal is. De ontwikkeling van het ven wijkt niet af van onze verwachtingen. Ook hier zijn maatregelen nodig om de kwaliteit van het ven ook op lange termijn te behouden. In het ven hebben we o.a. drijvende waterweegbree en stijve moerasweegbree aangetroffen. Oeverkruid hebben we niet aangetroffen.

- In het Boetelerveld komt een klein jeneverbesstruweel (H5130) voor (naast een aantal solitaire jeneverbesstruiken). Dit struweel is anders van samenstelling dan o.a. dat op de Sallandse heuvelrug. Door de geringe omvang en het beperkte aantal maatregelen dat mogelijk is, is het kwetsbaar. De ontwikkeling van het struweel wijkt niet af van onze verwachtingen. Opmerkelijk (maar bekend) is het achterblijven van verjonging van het struweel ondanks dat er bijvoorbeeld wel kale plekjes zijn waar zaden tot ontkieming zouden kunnen komen. Hiervoor is een onderzoeksopgave opgenomen.
- Het Boetelerveld heeft een grote oppervlakte vochtige heide (H4010A). Een groot deel daarvan wordt begraasd, een kleiner gedeelte gemaaid. Veel gedeeltes van de heide zijn al eens geplagd in het verleden. De soortensamenstelling is beperkt: vooral gewone dophei, maar ook blauwe-, geelgroene zegge en dwergzegge. Op één locatie hebben we beenbreek aangetroffen. In 2013 is er een oost-west verbinding gemaakt waarvoor de bovenlaag van de grond en het bos verwijderd is. De ontwikkeling van de heide wijkt niet af van onze verwachtingen. Vergrassing en opslag blijven een aandachtspunt. De ontwikkeling van de oost-west verbinding is ook in gang: het is een vochtige heide vegetatie in wording. Een soort als het heideblauwtje ontbreekt nog. De verwachting is dat deze over een paar jaar wel aanwezig is door natuurlijke successie. Pleksgewijs in de vochtige heide komen oppervlaktes voor die kwalificeren als pioniervegetaties met snavelbies. De verwachting is dat deze pleksgewijs zullen blijven voorkomen en niet per sé afhankelijk zijn van geplagde delen.
- De poelen die in het Boetelerveld voorkomen vormen leefgebied voor de kamsalamander. Afgelopen jaren zijn een aantal met leem bekleed. De ontwikkeling van de poelen lijkt ook goed. Het voorkomen van de kamsalamander wordt gemonitord. Het landhabitat is vooral rond de poelen maar de dieren kunnen zich door het gehele gebied verspreiden.

Conclusie

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied is volgens onze verwachting ten opzichte van de gebiedsanalyse en de uitgevoerde maatregelen.


Specifieke aandachtspunten voor 2017 zijn er niet.

Dit verslag is vastgesteld door:

 30 september 2016 namens Landschap Overijssel

 30 september 2016 namens provincie Overijssel

Bijlage: Kaart met bezochte gebieden



Foto's van het gebied

Het kleine turfkat met o.a. heischraal grasland en blauwgrasland



Het grote rietgat, een zwak gebufferd ven met drijvende waterweegbree



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen