

NATURA 2000-GBIED: BOETELERVELD

CONCEPT VERSLAG VELDBEZOEK DD. 4 AUGUSTUS 2021

Aanwezig namens Provincie:

[Redacted signature]

Aanwezig namens Terreinbeheerder (LO):

[Redacted signature]

Datum bezoek:

4 augustus 2021, 13.00-16.00 uur

Doelen

Op 4 augustus 2021 hebben wij een bezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Boetelerveld. Dit in het kader van het jaarlijkse veldbezoek zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Programma Aanpak Stikstof en het document 'Methodiek Veldbezoek PAS'. Het is bekend dat we geen PAS meer hebben. Desondanks maakten het Rijk en de provincies de afspraak dat we de monitoring voortzetten die onder het PAS is opgestart. De veldbezoeken zijn ook onderdeel van deze monitoring. Doel van het bezoek was na te gaan of de in de gebiedsanalyse voor het gebied voorziene ontwikkelingen van de diverse stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op koers liggen en hierover in overleg te treden met de betrokken TBO's. Dit betreft een veldimpressie die kan dienen als aanvulling op- en niet ter vervanging van de reguliere monitorings-systematiek.

Er is een ronde langs de volgende habitattypen/habitatsoorten gelopen:

1. Heischraal grasland (H6230);
2. 2tal poelen met drijvende waterweegbree (H1831)
3. Natuurontwikkeling op voormalige boslocaties met ontwikkeling naar uiteindelijk met name Vochtige heide (H4010A) en in mindere mate Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) en Blauwgrasland (H6410);
4. Groot rietgat (zwakgebufferd ven H3130) met daaromheen natuurontwikkeling;

Het gebied is in beheer bij Landschap Overijssel.

Gegevens:

- Beheerplan Boetelerveld
- PAS Gebiedsanalyse
- Methodiek Veldbezoek PAS

Bijlage(n):

- Kaart met de locaties die zijn bezocht, inclusief Habitattypenkaart (bijlage 1)

Bevindingen

In 2020 is de uitvoer van de PAS-maatregelen in het Boetelerveld gestart. Ten tijde van het veldbezoek in 2021 zijn deze al grotendeels uitgevoerd. Er is onder andere veel bos verwijderd (M7 en M8). Het verwijderen van bos zorgt voor vermindering verdamping en daardoor verhoging van zowel de zomer- als de wintergrondwaterstanden. Daarnaast zorgt het verwijderen van bos voor vermindering van lokale invang van stikstofdepositie.

Op de voormalige boslocaties is de ook de strooisellaag verwijderd. Dit om uitbreiding van de voor dit gebied relevante habitattypen te bewerkstelligen. Ondanks dat de maatregelen relatief recent zijn genomen, zien we toch al bemoedigende resultaten in de vorm van kenmerkende soorten.

Waar de negatieve effecten van de droge zomers tijdens de afgelopen jaren erg zichtbaar waren (bodem was toen erg droog) lijkt dit deze zomer wat minder het geval. Hoe het gebied zich de komende jaren qua hydrologie zal herstellen dankzij ondermeer de uitvoer van de maatregelen, daarover kunnen we nu geen conclusies trekken in het veld maar moet uit langjarige monitoring blijken.

Dit veldbezoek richten we ons met name op locaties waar recentelijk maatregelen hebben plaatsgevonden.

Bevindingen per locatie

Locatie 1: Noordwesthoek bij elektriciteitsmast .

We nemen hier een kijkje omdat de vigerende habitattypenkaart aangeeft dat hier heischraal grasland zou voorkomen. Terwijl dit volgens de beheerder onwaarschijnlijk is. Op deze locatie vinden we dit habitatype dan ook niet, en het heeft er waarschijnlijk ook nooit voorgekomen. Er is dus geen sprake van verlies van habitatype. Deze omissie zal in de volgende habitatypekaart aangepast worden

Locatie 2: Slenk

Tussen de slenk en locatie 1 (waar boskap heeft plaatsgevonden en de strooisellaag is verwijderd) komen we al een aantal leuke soorten tegen, zoals geelgroene zegge, dwergzegge en tormentil. In het noordelijke deel van de slenk staan veel (kwantitatief) zegge's.

Locatie 3: Poel 1

Om de poel ligt een zoom met moerashertshooi. In de poel is drijvende waterweegbree (habitatsoort) ingebracht. Dit is flink gegroeid. Er is nu nog bloei maar het blad begint al af te sterven.

Locatie 4: Vervolg slenk

Hier zijn wederom bemoedigende resultaten van de uitgevoerde maatregelen te zien. Ondermeer de volgende soorten worden regelmatig gespot: tormentil, diverse zegge's, kleine zonnedauw en snavelbiezen.

Locatie 5: Poel 2

De bodem van deze poel is opnieuw beleemd om ervoor te zorgen dat de poel niet meer 'lek' is. Dit lijkt goed geslaagd te zijn, aangezien de poel aardig vol met water staat. De habitatsoort drijvende waterweegbree is ook in deze poel aanwezig, zowel in het water als op de droogvallende leemranden.

Locatie 6: Omgeving Groot rietgat

Bij het groot rietgat zijn de rabatten weggehaald. Ook hier zijn er bemoedigende eerste resultaten van de uitgevoerde maatregelen zichtbaar. We zien ondermeer een zone met geelgroene zegge en wat plukjes melkviooltje welke zich mogelijk richting blauwgrasland kan ontwikkelen. Ook komen we kattestaart, rataar, tormentil, echte koekoeksbloem en blauwe knoop tegen. Hoger in het gradiënt vinden we ook hondsviooltje en moerasviooltje. In de nattere delen vinden we pilvaren.

In het groot rietgat zelf zal in het najaar nog slib uitgebaggerd worden.

Conclusie

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in het Natura 2000-gebied ligt op schema. We hebben in het veld geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de verwachtingen in de gebiedsanalyse. De bevindingen leiden tot het beeld dat op dit moment geen aanvullingen ten aanzien van de PAS-maatregelen nodig zijn. Op hoofdlijnen zijn de volgende constatering gedaan:

- Het merendeel van de PAS-maatregelen is inmiddels (recentelijk, m.n. 2021)) uitgevoerd. Dit betreft onder meer boskap en verwijderen strooisellaag. De eerste resultaten op deze locaties zijn positief, de soorten die worden aangetroffen zijn merendeels gewenst en de vegetaties hebben de potentie om zich tot habitattypen door te ontwikkelen.
- De zomer van 2021 was minder droog dan de voorgaande zomers. Dit heeft een positief effect op het gebied. De effecten van de voorgaande droge zomers in de afgelopen jaren waren tijdens de voorgaande veldbezoeken echter goed zichtbaar in het gebied. Gezien de vochtafhankelijke typen die hier voorkomen blijft dit een punt van zorg. De PAS maatregelen moeten een positief effect gaan hebben op de hydrologie van het gebied en het systeem robuuster maken voor dergelijke extremen. Er wordt monitoring met procesindicatoren ingezet om vinger aan de pols te houden op of de maatregelen voldoende effect hebben.

NATURA 2000-GEBIED: BOETELERVELD

BIJLAGE 1: BEZOCHTE LOCATIES



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen